

Makromycety na řepkovém poli

Spitzer Tomáš

Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787, Kroměříž

Když se v souvislosti s pěstováním polních plodin mluví o houbách (říše Fungi), má každý na mysli houbové patogeny, které se vyskytují na různých plodinách a způsobují ztráty na výnosech a kvalitě produkce. Občas, i když poměrně vzácně, je možné nalézt na poli také zástupce tzv. makromycét, což jsou téměř bez výjimky vlastní houby vřeckovýtrusé (Pezizomycotina) a houby stopkovýtrusé ze skupiny Agaricomycotina, které vytváří velké plodnice, s kterými jsme zvyklí se setkávat hlavně v lese a na loukách.

Houby nalézané na poli vyrůstají z půdy a s pěstovanou plodinou nemají nic společného, nebo se to alespoň zatím neví. Podzim 2013 byl velmi bohatý na srážky v říjnu, které byly doprovázeny nezvykle vysokými teplotami, a to je obecně vhodná kombinace pro růst hub. Při procházení řepkových porostů v Kroměříži a blízkých Pravčicích jsem zaznamenal relativně velké množství hub vyrůstajících mezi rostlinami ozimé řepky a zajímalo mě, o jaké druhy se jedná. S určením druhů (pouze na základě zaslaných fotografií) mi pomohl pan Ladislav Platil, člen Ústřední houbařské poradny ČMS v Praze, za což mu velmi děkuji.

Celkem se na řepkových polích vyskytli čtyři druhy hub:

- 1 hnojník, (nejpravděpodobněji hnojník domácí) - Obrázek č. 1
- 2 kukmák okázalý – Obrázek č. 2
- 3 límcovka modrá, nebo bělomodrá – Obrázek č. 3 a
- 4 pláčivka sametová – Obrázek č. 4

Většina z výše uvedených druhů hub je v literatuře uváděna jako nejedlá, nebo se různí autoři ve svém posouzení diametrálně liší. Jistě tedy je, že pro houby do smaženice si zatím budeme pořád chodit do lesa, ale je pozitivní zjištění, že se v monokulturní pustině nacházejí i jiné houby než tzv. fytopatogeny.



Obr 1: Hnojník, (nejpravděpodobněji hnojník domácí)



Obr 2: Kukmák okázalý



Obr 3: Límcovka modrá, nebo bělomodrá



Obr 4: Pláčivka sametová